

BLATUM GEL F

É um poderoso baraticida, a base de Fipronil, sua formulação apresenta alta atratividade se comparado aos produtos convencionais, além de não escorrer e tolerar situações adversas. Possui substância amargante a fim de evitar a ingestão por humanos tornando o produto seguro para uso em residências e locais públicos.

REGISTRADO MINISTÉRIO DE SAÚDE SOB No : 3.2699.0006.001-4

COMPOSIÇÃO:

- **FIPRONIL** 0,05%
- **Benzoato de Denatonium (amargante)** 0,001%
- **Atrativos** 99,95%

GRUPO QUÍMICO: Pirazol

CLASSE DE PRODUTO: Inseticida Gel

MODO DE AÇÃO: Inibidor Reversível do Receptor GABA

FINALIDADES DE USO: Controle de baratas

INDICAÇÃO DE USO:

- **BLATUM Gel** é uma isca inseticida gel pronto para uso profissional no controle de baratas.
- **BLATUM Gel** é eficaz contra barata alemã (*Blattella germanica*) e barata americana (*Periplaneta americana*) tanto para as ninfas quanto para os adultos. Uma vez ingerido pelas baratas, estas irão contaminar as outras através da troca de alimentos, através da canibalização de carcaças mortas pelo contato primário, bem como ingerindo as fezes das baratas contaminadas, gerando o efeito em cadeia por contaminação secundária.
- **BLATUM Gel** pode ser utilizado contra as baratas em habitações (incluindo cozinhas), edifícios públicos tais como hospitais, prisões, teatros, hotéis etc, instalações industriais e comerciais tais como usinas, magazines, restaurantes, etc, cozinhas industriais, oficinas, aeronaves, veículos, trens e embarcações.

Instruções de Uso:

Em caso de infestação severa e em áreas que são particularmente sujas, não asseadas ou onde fontes alternativas de alimento não possam ser totalmente eliminadas, usar uma alta dosagem de aplicação.

- **Barata alemã** (*Blatella germanica*):

Dose Alta: Duas gotas de 0,03 g de gel por ponto de iscagem.

Dose Normal: Uma gota de 0,03 g de gel por ponto de iscagem

- **Barata americana** (*Periplaneta americana*):

Dose Alta: Três gotas de 0,03 g de gel por ponto de iscagem..

Dose Normal: Duas gotas de 0,03 g de gel por ponto de iscagem.

Uma suave pressão no gatilho da pistola aplicadora soltará uma gota de 0,03g a qual deverá ser entre 3 a 4 mm de diâmetro.

Modo de Aplicação

- **BLATUM Gel** é mais efetivo quando posicionado dentro ou próximo aos abrigos e áreas de alimentação das baratas. Estas áreas são tipicamente escuras, quentes, úmidas e permanecem intocadas, como por exemplo, atrás de refrigeradores e equipamentos elétricos. Localizar tais áreas através de técnicas apropriadas, tais como inspeção ou uso de armadilhas. Para melhores resultados, a superfície a ser tratada deve ser limpa e asseada antes do tratamento prestando atenção particular para a remoção de fontes de alimentos alternativos.

- Os cartuchos de **BLATUM Gel** são confeccionados para serem usados, com o embolo dosador incluso na embalagem ou com uma pistola aplicadora. Prenda o cartucho de **BLATUM Gel** à pistola aplicadora e anexe a ponteira de aplicação apropriada. Consultar as instruções do fabricante para informações sobre o uso da pistola aplicadora.

- **BLATUM Gel** deve ser aplicado por toda área infestada em pequenas gotas. Gotas do gel devem ser aplicadas em locais escuros, fora de visão, em fendas, rachaduras, atrás de armários e prateleiras, painéis de energia elétrica, dutos, sob peças sanitárias etc. Não aplicar **BLATUM Gel** em locais que são lavados ou onde pode ser facilmente removido por limpeza rotineira. Não aplicar inseticidas sobre ou próximo à **BLATUM Gel** e não posicionar o produto em superfícies recentemente tratadas, pois isto pode desencorajar as baratas a se alimentarem do gel.

- Se **BLATUM Gel** contaminar a superfície não-alvo, remover o gel com uma toalha de papel e a jogue no lixo.

- Baratas vão morrer poucas horas depois de uma única alimentação com **BLATUM Gel**.

- Em áreas infestadas, baratas mortas serão encontradas normalmente 24 horas após o tratamento.

- Áreas tratadas devem ser re-inspecionadas depois de 1 a 2 semanas. Onde a infestação inicial era severa, pode ser necessária uma segunda aplicação de **BLATUM Gel**, caso o primeiro tratamento tenha sido totalmente consumido e ainda haja a presença de baratas vivas.

- Após cada aplicação, monitorar a área para determinar o momento ideal do próximo tratamento. Com o uso adequado de **BLATUM Gel**, a área tratada poderá manter-se com controle ideal por até 3 meses após a aplicação.

Precauções para Proteger a Saúde e meio ambiente.

Antes de usar leia com atenção as instruções contidas na embalagem do produto.