

Ficha Técnica LESMAX

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



Nome Comercial: Moluscicida

Lesmax

Nome Comum: Metaldeído

Categoria: Isca granulada

Registro Ministério da Saúde:

M.S 3.2781.0014

Composição química: r-2,c-4,c-6,c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane

PRIMEIROS SOCORROS:

-Em caso intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

-Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.

-Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

-Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

COMPOSIÇÃO:

METALDEÍDO.....3,00% p/p

Inertes (Atrativos, veículo e corante)97,0% p/p

INDICAÇÕES DE USO:

MOLUSCICIDA LESMAX é um produto elaborado com METALDEÍDO, eficaz no controle de lesmas (*Sarasinula linguaeformis*) e caramujos africanos (*Achatina fulica*).

MODO DE USAR E DOSAGEM:

Pragas	Dosagem/ Área
	g /m ²
Lesmas (<i>Sarasinula linguaeformis</i>)	3
Caramujos africanos (<i>Achatina fulica</i>)	3
Aplicar 5g/m ² em altas infestações	

Aplicar LESMAX na dose de 3 g/m² (equivalente a uma colher de chá), distribuindo o produto no solo entre as plantas. Em altas infestações, aplicar 5 g/m² (proporcional a uma colher de sopa). Em árvores e arbustos, aplicar por toda copa através de porta iscas.

Se necessário reaplicar o produto após 7 a 10 dias.

RECOMENDAÇÕES:

-Aplicar LESMAX através de porta-iscas dispendo-os diretamente sobre o solo.

-Geralmente os moluscos são encontrados próximo a canteiros, vasos, estufas e viveiros de mudas.

Priorizar controle em noites quentes e úmidas.

PRECAUÇÕES:

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação.

-Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.

-Não fumar ou comer durante a aplicação.

-Manter o produto na embalagem original.

-Não reutilizar as embalagens vazias.

-Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.

-Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

Em caso de derramamento, isole e sinalize a área contaminada. Recolher o produto com auxílio de uma pá, acondicionando em recipiente adequado, lacrando e identificando-o e contatar a empresa fabricante para indicação de destinação final.

Descarte as embalagens vazias de acordo com as legislações vigentes. Caso não disponha de serviço especializado, consulte a empresa fabricante para orientações de como devolver as embalagens vazias.

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nei Aparecido Padovan

CRO: 04217828 – IV Região

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Tetroxocano

Nome Comum: Metaldeído

Ação Tóxicas: Não conhecida

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico / Tratamento Sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110

FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC:0800-9401018