

### (PIRIMIFÓS-METÍLICO)

Inseticida concentrado emulsionável eficaz no controle de mosquitos, muriçocas, moscas, baratas, pulgas e carunchos.

# VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROIBIDA A VENDA LIVRE

**CUIDADO! PERIGOSO!**

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

## Conteúdo: 1 litro

*“Este produto é de uso exclusivo por empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, nos diversos ambientes, tais como indústrias em geral, instalações de produção, importação, exportação, manipulação, armazenagem, transporte, fracionamento, embalagem, distribuição e comercialização de: alimentos, produtos farmacêuticos, produtos para saúde, perfumes, produtos para higiene e cosméticos para a saúde humana e animal, fornecedores de matéria-prima, áreas hospitalares, clínicas, clubes, “shopping centers”, residências e condomínios residenciais e comerciais, veículos de transporte coletivo, aeronaves, embarcações, aeroportos, portos, instalações aduaneiras e portos secos, locais de entretenimento e órgãos públicos e privados, entre outros.”*

#### COMPOSIÇÃO

**Ingrediente Ativo:** PIRIMIFÓS-METÍLICO .....50% m/v (48,78% m/m)  
**Ingredientes inertes:** tensoativo, solvente .....52,5% m/v (51,22% m/m)

#### MODO DE APLICAÇÃO OU USO

**APLICAÇÃO RESIDUAL:** Aplique **ACTELIC PROF** diluído em água com pulverizador manual ou motorizado.

**Controle de baratas e moscas:** Dilua 100 a 200 mL de **ACTELIC PROF** em 10 Litros de água e aplique uniformemente (200 m<sup>2</sup>) onde as pragas ocorrem, pousam e se escondem. No controle de baratas, aplicar em frestas, cantos, pisos, rachaduras em áreas externas. No controle de moscas, aplique uniformemente no teto, paredes, janelas, portas, cantos, fios e superfícies onde as moscas pousam, formando uma superfície tratada em áreas externas.

Recomenda-se que pessoas e animais fiquem fora do local tratado por no mínimo 4 horas após a aplicação do produto.

**Controle de pulgas:** Dilua 50 mL de **ACTELIC PROF** em 10 Litros de água e aplique uniformemente (200 m<sup>2</sup>) onde as larvas e adultos das pulgas ocorrem, principalmente em pisos, tacos, gramados, frestas, cantos em áreas externas.

Os locais, utensílios e superfícies onde os animais dormem e ficam a maior parte do dia devem ser cuidadosamente lavados, limpos e secos antes da reentrada destes animais.

**Controle do caruncho no ambiente:** Dilua 100 mL de **ACTELIC PROF** em 10 Litros de água e aplique uniformemente (200 m<sup>2</sup>) onde as pragas ocorrem, pousam e se escondem. Aplique uniformemente em áreas internas e externas, tais como pisos, paredes, nos locais escuros, frestas, rachaduras, cantos, estrados de madeira e entulhos.

**“Produto de aplicação restrita ao ambiente, não aplicar sobre alimentos, embalagens e grãos armazenados”.**

**“Após a aplicação do produto, os locais que receberão alimentos deverão ser cuidadosamente lavados, limpos com água e sabão e secos para evitar contaminação”.**

| Pragas          | Ingrediente ativo/área (mg i.a. / m <sup>2</sup> ) | Diluição de ACTELIC PROF mL por 10 Litros | Área tratada (m <sup>2</sup> ) |
|-----------------|--|---|--------------------------------|
| Mosca e Baratas | 250- 500   | 100 - 200                                 | 200                            |
| Pulgas          | 125  | 50  | 200                            |
| Caruncho        | 250  | 100                                       | 200                            |

**Larvas de moscas:** Dilua 100 a 200 mL de **ACTELIC PROF** em 10 Litros de água e aplique com um pulverizador costal ou motorizado em 100 m<sup>2</sup> de superfície tais como lagoas de tratamento de efluentes, esterco, lixo e demais focos de larvas como fezes e matéria orgânica. Repita a pulverização a cada 7 a 10 dias ou quando houver reinfestação de larvas.

| Pragas           | Ingrediente ativo/área (mg i.a. / m <sup>2</sup> ) | Diluição de ACTELIC PROF mL por 10 Litros | Área tratada (m <sup>2</sup> ) |
|------------------|--|---|--------------------------------|
| Larvas de Moscas | 500 - 1000   | 100 - 200                                 | 100                            |

**Larvas e pupas de Mosquitos ou Muriçocas – Aedes aegypti e Culex sp:** Dilua 10 a 100 mL de **ACTELIC PROF** em 10 Litros de água e aplique com um pulverizador costal em aproximadamente 1000 m<sup>2</sup> de superfície de lâmina d'água sobre focos de larvas e pupas, como pneus, lixo, terrenos baldios e entulhos que estejam armazenando água. Repita a pulverização quando houver reinfestação de larvas.

| Pragas   | Ingrediente ativo/área (mg i.a. / m <sup>2</sup> ) | Diluição de ACTELIC PROF mL por 10 Litros | Área tratada (m <sup>2</sup> ) |
|--|--|---|--------------------------------|
| Larvas e pupas de mosquitos Aedes (Dengue) e Culex | 5 - 50   | 10 a 100                                  | 1000                           |

#### APLICAÇÃO ESPACIAL:

**Termonebulização ou FOG – Aedes aegypti (Dengue) e Culex sp (mosquitos, pernilongos ou Muriçocas):** Aplique ao redor de cada quadra de casas, devendo-se observar que o vento esteja direcionado para o centro da quadra. Não aplique em dias de chuva, excesso de vento e altas temperaturas ou horários de muito trânsito de veículos.

A aplicação deve ser realizada imóvel por imóvel, iniciando do fundo do quintal, rodeando a casa e permitindo a entrada do inseticida no intradomicílio através das portas e janelas abertas. Considere uma faixa de cobertura efetiva de até 10 metros. Recomenda-se a reentrada na área tratada após 1 hora da aplicação do produto.

#### TERMONEBULIZAÇÃO ou FOG

| Pragas   | Ingrediente ativo/área (g i.a. / ha) | Diluição de ACTELIC PROF em óleo mineral para formar 1 Litro de calda | Solução inseticida por área (10.000 m <sup>2</sup> ou 1 ha) |
|--|--------------------------------------|---|---|
| Aedes aegypti (Dengue)                         | 25 - 200                             | 25 mL - 200 mL  | 2 L/ha  |
| Culex sp (Mosquitos, pernilongos ou muriçocas) | 100 - 200                            | 100 mL - 200 mL   | 2 L/ha  |

**Nebulização UBV (Ultra Baixo Volume) - Aedes aegypti (Dengue) e Culex sp (mosquitos, pernilongos ou Muriçocas):**

Use vazão de 200 mL / minuto para uma velocidade máxima de deslocamento do veículo de 10 km/hora. Aplique ao redor de cada quadra de casas, devendo-se observar que o vento esteja direcionado para o centro da quadra. Não aplique com ocorrência de chuva, excesso de vento ou altas temperaturas.

Na aplicação com costal motorizado, use vazão de 50 mL / minuto e a aplicação será realizada imóvel por imóvel, iniciando do fundo do quintal, rodeando a casa e aspergindo o inseticida no intradomicílio através das portas e janelas abertas.

Recomenda-se a reentrada na área tratada após 1 hora da aplicação do produto.

#### NEBULIZAÇÃO UBV (Ultra Baixo Volume)

| Pragas   | Ingrediente ativo/área (g i.a. / ha) | Diluição de ACTELIC PROF para formar 1 Litro de calda (em água ou óleo) | Solução inseticida por área (10.000 m <sup>2</sup> ou 1 ha) |
|--|--------------------------------------|---|---|
| Aedes aegypti (Dengue), Culex sp (Mosquitos, pernilongos ou muriçocas) | 100 - 200                            | 400 mL - 800 mL   | 0,5 L/ha  |

#### INSTRUÇÕES DE USO

##### Recomendações gerais:

- PRODUTO DE APLICAÇÃO RESTRITA AO AMBIENTE, INSTALAÇÕES, ÁREAS EXTERNAS E SUPERFÍCIES. NÃO APLICAR SOBRE ANIMAIS E UTENSÍLIOS.
- Os utensílios e alimentos somente poderão ser recolocados no ambiente após o local estar cuidadosamente lavado, limpo e seco.
- Retirar todos os alimentos e utensílios do local antes da aplicação.
- Cobrir os alimentos e proteger os utensílios que não puderem ser retirados do local.
- Pessoas e animais não devem permanecer no local durante a aplicação.
- Diluir o produto somente na quantidade exata que será utilizada para evitar sobras de produto. Seguir as recomendações de uso especificadas para cada praga que se irá controlar.
- Agitar bem o pulverizador para homogeneizar a calda.
- Aplicar o produto com pulverizador adequado para cada situação evitando-se a contaminação indesejada de superfícies e utensílios.
- Usar equipamento de proteção individual e evitar entrar em contato com a névoa inseticida.
- As superfícies onde os animais dormem e ficam a maior parte do dia devem ser cuidadosamente lavadas, limpas e secas antes da reentrada destes animais.
- Seguir as demais precauções de uso escritas no rótulo para maior segurança do aplicador e do local.

#### RESTRICÇÕES DE USO

Uso exclusivo por entidades especializadas.

O produto quando aplicado nas doses e formas recomendadas não apresenta demais restrições de uso.

#### CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

- Conserve em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C).

- Proteja da umidade.

#### PRECAUÇÕES DE USO

##### CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

- CUIDADOS! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.
- Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias.
- Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Em caso de contato direto com este produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito.
- Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Usar roupa protetora adequada, luvas impermeáveis, protetor ocular e máscara de proteção com filtro adequado.
- Antes de descartar a embalagem vazia, realizar tripla lavagem das mesmas: colocar água limpa, tampar e agitar vigorosamente por cerca de 30 segundos. Repetir esta operação pelo menos 3 vezes, aproveitando a água da lavagem para preparo de calda inseticida.
- Para descarte de embalagem, observe a legislação Municipal, Estadual ou Federal específica.
- Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou em superfícies aquecidas.
- Em caso de acidente com derrame de produto, recolha o mesmo com absorvente inerte (terra, serragem, sílica gel ou outro) e consulte a empresa registrante através do número de telefone indicado no rótulo para a destinação final adequada.
- Este produto contém Pirimifós-metilico que inibe a colinesterase.

#### FABRICADO POR:

##### SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

Fábrica: Rod. Professor Zeferino Vaz, SP 332, s/nº, km 127,5 - Santa Terezinha - Paulínia - SP

CEP: 13148-915 - CNPJ: 60.744.463/0010-80;

##### IPANEMA - INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS

Rod. Raposo Tavares, km 113 - Araçoiaba da Serra - SP - CNPJ: 64.687.015/0001-52 - CEP: 18190-000;

SYNGENTA, S.A. - Carretera a Mamonal, km 6, Cartagena, Colombia.

#### INDÚSTRIA BRASILEIRA

Registro MS Nº: 3.0119.6638

Serviço de Atendimento ao Consumidor: C.A.S.A. 0800 704 4304

Responsável Técnico: Amarildo Ament - CRQ nº. 04215750 - IV Região - SP

“ACTELICPROF e o logo Syngenta são marcas de uma Companhia do Grupo Syngenta”.

#### Indicações para uso médico

Grupo Químico: organofosforado

Nome Comum: PIRIMIFÓS-METÍLICO

Antídoto e Tratamento: Atropina, oximas e tratamento sintomático

Telefone de emergência 24h: 0800 704 4304

#### Nº do Lote: Impresso na embalagem

Data de Fabricação: Impresso na embalagem

Prazo de Validade: 4 anos após a data de fabricação