



Klerat[®] Pellets

Raticida

(BRODIFACOUM 0,005% m/m)

Raticida isca em pellets anticoagulante

de dose única, eficaz contra ratos e camundongos.



VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS PROIBIDA A VENDA LIVRE

CUIDADO!  VENENO!

**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE
USO, AS PRECAUÇÕES GERAIS E ADVERTÊNCIAS DO
RÓTULO E/OU PROSPECTO ANTES DE
UTILIZAR O PRODUTO**

Peso Líquido: **1 kg**

“Este produto é de uso exclusivo por empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, nos diversos ambientes, tais como indústrias em geral, instalações de produção, importação, exportação, manipulação, armazenagem, transporte, fracionamento, embalagem, distribuição e comercialização de: alimentos, produtos farmacêuticos, produtos para saúde, perfumes, produtos para higiene e cosméticos para a saúde humana e animal, fornecedores de matéria-prima, áreas hospitalares, clínicas, clubes, “shopping centers”, residências e condomínios residenciais e comerciais, veículos de transporte coletivo, aeronaves, embarcações, aeroportos, portos, instalações aduaneiras e portos secos, locais de entretenimento e órgãos públicos e privados, entre outros.”

COMPOSIÇÃO

Ingrediente ativo: BRODIFACOUM 0,005% m/m
Benzoato de denatonium (Bitrex) 0,001% m/m
Ingredientes inertes: Solventes, diluente, atrativo, conservante, tensoativo, corante 99,994% m/m
Contém Bitrex para prevenir a ingestão humana.

INSTRUÇÃO DE USO

- Colocar as iscas nas tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam.
- Colocar as iscas de modo que os roedores possam comer sem serem molestados e que o maior número possível de roedores tenha acesso ao raticida.
- Assim, a quantidade de pontos de iscagem irá variar de acordo com o grau de infestação e o tamanho da área a ser desratizada.
- Como recomendação geral, deve-se colocar 25g em cada toca e em cada ponto de iscagem. Os pontos de iscagem devem estar distantes 5 a 10 metros entre si e dispostos de modo a evitar o acesso de crianças ou animais domésticos.
- Efetuar uma inspeção após 7 a 10 dias para avaliar o nível de consumo e controle. Reaplicar nos locais onde houve consumo e, após terminada a desratização, recolher as sobras dos locais onde não houve consumo.
- Este produto não é indicado para uso em áreas sujeitas à umidade.
- A empresa controladora de pragas deve efetuar monitoramento constante, identificando os pontos permanentes de aplicação de produto, aplicar em locais protegidos e utilizar caixas iscas resistentes, seguras e fechadas para proteger a isca do contato por crianças e animais domésticos.
- Não aplicar em locais de manuseio de alimentos ou em utensílios que possam ter contato com alimentos. Deve-se restringir o acesso dos roedores a alimentos e água durante a noite, mantendo a aplicação das iscas até que o consumo pare ou as infestações sejam controladas. Deve-se manter pontos permanentes de aplicação em locais sujeitos a infestações constantes de roedores.

RESTRIÇÃO DE USO

- produto quando aplicado nas doses e formas recomendadas não apresenta demais restrições de uso.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

- Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30 °C).
- Proteger da umidade.

PRECAUÇÕES DE USO

- CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- CUIDADO! PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE.**
- Durante o manuseio, usar luvas, máscaras, proteção ocular e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar, beber ou comer durante a aplicação.
- Aplicar somente em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos.
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.
- Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.
- Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não se deve contaminar os cursos de água.
- Advertir os usuários sobre as medidas e segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Não reutilizar as embalagens. Manter o produto na embalagem original.
- Em caso de ingestão não provoque o vômito. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental por animais domésticos e fauna, procurar um Médico Veterinário levando a embalagem ou o rótulo do produto. Ligar para o telefone de emergência 24 horas (0800 704 4304).

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em temperatura ambiente, protegido do sol, do calor e fora do alcance de crianças e dos animais. Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

Após a utilização do raticida recomenda-se descartar os roedores mortos (queimar ou enterrar); restos do agente tóxico (isca) deteriorados devem ser embalados, usando-se luvas e sacos de descarte de material, e enviados para incineração ou consulte o fabricante ou órgão ambiental sobre os procedimentos adequados. Restos de embalagens devem ser adequadamente embalados e enviados ao distribuidor ou ao programa de reciclagem aprovado e credenciado. Observar a legislação Municipal, Estadual ou Federal específica.

- Após a aplicação tome banho e troque de roupa. Não misture a roupa contaminada com a de uso diário.

FABRICADO POR:

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. Rod. Professor Zeferino Vaz - SP 332, s/nº, km 127,5 - Paulínia - SP - CEP: 13148-915 - CNPJ: 60.744.463/0010-80;
BIOQUÍMICA de COLOMBIA S.A.S: Bogotá City, Colombia, Carrera 16 N°. 10-42 - Barrio: Voto Nacional;
SERVER QUÍMICA: Av. Norberto Carvalho, nº 1473 - Bloco 7B - Lorenzetti - Vera Cruz - SP - CEP: 17560-000 - CNPJ: 04900875/0001-81;
IPANEMA - INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS - Rod. Raposo Tavares, km 113 - Araçoiaba da Serra - SP - CEP: 18190-000 - CNPJ: 64.687.015/0001-52.
Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Consumidor: C.A.S.A. 0800 704 4304

Registro no M.S. nº: 3.0119.6661

Responsável Técnico: Amarildo Ament - CRQ nº: 04215750 - IV Região - SP.

“O nome do produto e o logo Syngenta são marcas de uma Companhia do Grupo Syngenta”.
‘Bitrex’ e logotipo Bitrex são marcas registradas da Macfarlan Smith Limited.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Cumarínico

Nome Comum: BRODIFACOUM

Antídoto e Tratamento: Vitamina K1 e tratamento sintomático

Telefone de emergência 24 horas: 0800 704 4304

Nº do Lote: Impresso na embalagem

Data de Fabricação: Impresso na embalagem

Prazo de Validade: 2 anos após a data de fabricação