

## FICHA TÉCNICA

### ARMADILHA ADESIVA COM FEROMÔNIOS E ATRATIVOS ALIMENTARES PARA INSETOS RASTEJANTES

#### 1. NOME COMERCIAL: 3 WAY PHERO PACK - Armadilha Multiespecífica

Dispositivo de monitoramento para detecção de insetos como *Tribolium* spp., *Sitophilus* spp., *Oryzaephilus* spp., *Trogoderma* spp., *Lasioderma serricorne*, *Stegobium paniceum*, baratas e traças-de-livro (*silverfish*), pronta para uso, contendo *dispenser* de feromônios atrativos para determinadas espécies e tablete de atrativos fagoestimulantes para outras espécies.

#### 2. IMAGENS:



#### 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Dispositivo de monitoramento no formato de armadilha adesiva.

##### Composição:

- Papel cartão plastificado impresso com o nome da armadilha (3 way trap) e representações das pragas alvo nas faces externas, montada em formato triangular e contendo aberturas para a entrada dos insetos alvo.
- “Cola à prova de poeira”: a forma diferenciada como a cola é aplicada na superfície da armadilha aumenta a área de superfície disponível de cola, proporcionando boa aderência, mesmo em ambientes empoeirados.
- *Dispenser* contendo feromônios atrativos específicos para algumas das espécies alvo da armadilha e tablete contendo atrativos fagoestimulantes para as outras espécies alvo da armadilha.
- Embalagem externa em papel laminado com 3 camadas.

**Observação: a armadilha já vem montada e pronta para uso.**

##### Tamanho da armadilha montada:

Lado 1: 100 mm

Lado 2: 100 mm

Hipotenusa: 141 mm

Altura: 20 mm

**Quantidade de cola na armadilha:** 4g

**Área coberta de cola:** Cola distribuída em faixas simétricas, espalhadas na parte central dos triângulos que constituem a armadilha. As faixas paralelas de cola evitam a perda de aderência devido ao depósito de poeira.

**Cor:** Conforme imagens.

#### **4. INSTRUÇÕES DE USO:**

I) Abrir o envelope metálico.

II) Instalar a armadilha no local a ser monitorado.

#### **Instalar as armadilhas nos seguintes locais:**

Indústria de alimentos, moinhos, silos, armazéns, depósitos, supermercados, lojas de ervas, despensas e todos locais onde são processados e/ou estocados: cereais, trigo, biscoitos, pães, massas, cacau, chocolate, doces, frutas secas, nozes, chás, tabaco, etc.

- Próximo a locais úmidos e quentes, ou qualquer local onde haja suspeita de infestação.
- Locais escuros.
- No chão.

A armadilha pode ser fixada no chão por meio de fitas adesivas, a fim de reduzir a mobilidade da armadilha e protegê-la contra golpes e movimentos não intencionais.

Sugere-se identificar cada armadilha dentro de uma sequência numérica que pode ser indicada no mapeamento da área de instalação, a fim de facilitar a conferência de cada armadilha quando da realização das visitas periódicas do trabalho de controle integrado de pragas.

Caso haja necessidade de manipular o dispenser de feromônio ou o tablete de atrativo alimentar, é importante fazer o uso de luvas. A contaminação desses dispositivos com odores presentes nas mãos do operador pode reduzir a atratividade da armadilha.

**Área de distribuição da armadilha:** Distância máxima de 5 metros entre cada armadilha instalada, definida conforme o nível de infestação.

**Período sugerido para uso da armadilha:** O ano todo.

**Frequência sugerida para acompanhamento:** Semanal. Troque a armadilha após um período máximo de 60 dias, ou antes, conforme o grau de infestação (número de insetos capturados na área de cola) e de acordo com a presença de umidade ou partículas em suspensão (poeiras) no ambiente de instalação da armadilha. Observação: O uso da armadilha em locais excessivamente úmidos ou empoeirados pode reduzir a vida útil e a efetividade do produto.

**Condições de armazenamento:** Ambiente seco (umidade relativa abaixo de 55%) e fresco (temperatura abaixo de 25°C). Se for mantido na embalagem original e bem armazenado, o produto tem validade de 3 anos. Após aberto o envelope, o feromônio dura 60 dias.

**5. EMBALAGEM:** Envelope metálico contendo 2 armadilhas.

**6. DESCARTE:** Lixo comum/rejeito.