

FICHA TÉCNICA

ARMADILHA ADESIVA COM FEROMÔNIOS E ATRATIVOS ALIMENTARES PARA INSETOS RASTEJANTES

1. NOME COMERCIAL: 3 WAY PHERO PACK - Armadilha Multiespecífica

Dispositivo de monitoramento para controle dos seguintes insetos pragas alvo: *Tribolium* spp., *Sitophilus* spp., *Lasioderma serricorne*, *Oryzaephilus* spp., *Trogoderma* spp., *Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Supella longipalpa*, *Lepisma saccharina*, *Thermobia domestica* e *Liposcelis* spp., pré-ativada com feromônios multiespecíficos e com atrativo alimentar multiespecífico.

2. IMAGENS:



ARMADILHA



ATRATIVOS

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Dispositivo de monitoramento no formato de armadilha adesiva.

Composição:

- Papel cartão impresso nas faces externas e plastificado nas faces internas, montada em formato triangular e contendo aberturas para a entrada dos insetos alvo, além de 2 aberturas superiores para posicionamento dos atrativos de feromônio e alimentar.
- Cola de fusão a quente e alta aderência.
- *Dispenser* contendo feromônios multiespecíficos e tablete contendo atrativos alimentares, ambos inseridos dentro da armadilha.
- Fechamento da armadilha feito com cola específica.
- Embalagem externa em papel laminado com 3 camadas.

Observação: a armadilha já vem montada e pronta para uso.

Tamanho da armadilha montada:

Lado 1: 100 mm

Lado 2: 100 mm

Hipotenusa: 141 mm

Altura: 20 mm

Quantidade de cola na armadilha: 4g

Área coberta de cola: Cola distribuída em faixas simétricas, espalhadas na parte central dos triângulos que constituem a armadilha. As faixas paralelas de cola evitam a perda de aderência devido ao acúmulo de poeira.

Cor: Conforme imagens.

4. INSTRUÇÕES DE USO:

I) Abrir o envelope metálico.

II) Instalar a armadilha no local a ser monitorado.

Instalar as armadilhas nos seguintes locais:

Indústria de alimentos, moinhos, silos, armazéns, depósitos, supermercados, lojas de ervas, despensas e todos locais onde são processados e/ou estocados: cereais, trigo, biscoitos, pães, massas, cacau, chocolate, doces, frutas secas, nozes, chás, tabaco, etc.

- Próximo a locais úmidos e quentes, ou qualquer local onde haja suspeita de infestação.
- Locais escuros.
- No chão.

A armadilha pode ser usada em sua forma original ou dentro de dispositivos porta-armadilha, a fim de proteger a armadilha da poeira, água, umidade e mofo.

A armadilha pode ser fixada no chão por meio de fitas adesivas, a fim de reduzir a mobilidade da armadilha e protegê-la contra golpes e movimentos não intencionais.

Sugere-se identificar cada armadilha dentro de uma sequência numérica que pode ser indicada no mapeamento da área de instalação, a fim de facilitar a conferência de cada armadilha quando das vistorias periódicas do trabalho de controle integrado de pragas.

Área de distribuição da armadilha: Distância de 3 a 5 metros entre cada armadilha instalada, definida conforme o nível de infestação.

Período sugerido para uso da armadilha: O ano todo.

Frequência sugerida para acompanhamento: Semanal. Troque a armadilha após um período máximo de 60 dias, ou antes, conforme o grau de infestação (número de insetos capturados na área de cola) e de acordo com a presença de umidade ou partículas em suspensão (poeiras) no ambiente de instalação da armadilha. Observação: O uso da armadilha em locais excessivamente úmidos ou empoeirados pode reduzir a vida útil e a efetividade do produto.

Condições de armazenamento: Ambiente seco (umidade relativa abaixo de 55%) e fresco (temperatura abaixo de 25°C). Se for mantido na embalagem original e bem armazenado, o produto tem validade de 3 anos. Após aberto o envelope, o feromônio dura 60 dias.

5. EMBALAGEM: Envelope metálico contendo 2 armadilhas.

6. DESCARTE: Lixo comum/rejeito.