



Talon® BlocosXT

Raticida

(BRODIFACOUM 0,005% m/m)

Raticida extrusado anticoagulante de dose única, eficaz contra ratos e camundongos.

VENDA RESTRITA A INSTUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECALIZADAS - PROIBIDA A VENDA LIVRE

CUIDADO! **VENENO!**

“LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO, AS PRECAUÇÕES GERAIS E ADVERTÊNCIAS DO RÓTULO E / OU PROSPECTO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO”

PESO LÍQUIDO: 7,26 kg (Blocos de 20 g)

COMPOSIÇÃO

Ingrediente ativo: BRODIFACOUM 0,005% m/m
Benzoato de denatonium (Bitrex) 0,001% m/m
Ingredientes inertes: Solventes, diluente, atrativo, conservante, tensoativo, corante 99,994% m/m

Contém Bitrex para prevenir a ingestão humana.

“Este produto é de uso exclusivo por empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, nos diversos ambientes, tais como indústrias em geral, instalações de produção, importação, exportação, manipulação, armazenagem, transporte, fracionamento, embalagem, distribuição e comercialização de: alimentos, produtos farmacêuticos, produtos para saúde, perfumes, produtos para higiene e cosméticos para a saúde humana e animal, fornecedores de matéria-prima, áreas hospitalares, clínicas, clubes, “shopping centers”, residências e condomínios residenciais e comerciais, veículos de transporte coletivo, aeronaves, embarcações, aeroportos, portos, instalações aduaneiras e portos secos, locais de entretenimento e órgãos públicos e privados, entre outros.”

INSTRUÇÕES DE USO: O produto Talon é um bloco extrusado eficaz contra ratos e camundongos.

- Colocar as iscas nas tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam;
- Colocar as iscas de modo que os roedores possam comer sem serem molestados e que o maior número possível de roedores tenha acesso ao raticida;
- A quantidade de pontos de iscagem deve estar de acordo com o grau de infestação e o tamanho da área a ser desratizada;
- Como recomendação geral, deve-se colocar 1 bloco em cada toca e em cada ponto de iscagem, evitando o contato direto das mãos com o produto. Os pontos de iscagem devem estar distantes 5 a 10 metros entre si e dispostos de modo a evitar o acesso de crianças ou animais domésticos.
- Efetuar uma inspeção após 7 a 10 dias para avaliar o nível de consumo e controle. Reaplicar nos locais onde houve consumo e recolher, após terminada a desratização, as sobras dos locais onde não houve consumo.

RESTRIÇÕES DE USO: Produto de uso exclusivo por entidades especializadas.

O produto, quando aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15° e 30°C)

PRECAUÇÕES DE USO:

- **CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE**
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Em caso de contato direto com este produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Pode ser fatal se ingerido. EM CASO DE INGESTÃO NÃO PROVOQUE VÔMITO.
- Durante o manuseio, usar luvas, máscaras, proteção ocular e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber nem fumar durante a aplicação.
- Depois de aplicar o produto e, no caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância, em contato com os olhos, lavar com água em abundância.
- Aplicar somente em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos.
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.
- Usar luvas, máscara e proteção ocular.
- Não transportar nem armazenar com alimentos.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes
- Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não se deve contaminar os cursos de água.
- Não reutilizar as embalagens. Manter o produto na embalagem original.

ARMAZENAMENTO: Armazenar o produto em temperatura ambiente, protegido do sol, do calor e fora do alcance de crianças e dos animais. Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE: Após a utilização do raticida recomenda-se descartar os roedores mortos (queimar ou enterrar); restos do agente tóxico (isca) deteriorados devem ser embalados, usando-se luvas e sacos de descarte de material, e enviados para incineração ou consulte o fabricante ou órgão ambiental sobre os procedimentos adequados. Restos de embalagens devem ser adequadamente embalados e enviados ao distribuidor ou ao programa de reciclagem aprovado e credenciado. Não reutilizar as embalagens vazias para outros fins.

FABRICADO POR:

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

Fábrica: Rod. Professor Zeferino Vaz - SP 332, s/nº - km 127,5 - Santa Terezinha - SP - CEP: 13148-915

Tel: (19) 3874-5800 - CNPJ: 60.744.463/0010-80.

IPANEMA INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS:

Rod. Raposo Tavares, km 113 - Araçoiaba da Serra - SP - CEP: 18190-000 - CNPJ: 64.687.015/0001-52.

Indústria Brasileira

HACCO, Inc., 110 Hopkins Drive - Randolph, WI 53956

Serviço de Atendimento ao Consumidor: C.A.S.A. 0800 704 4304

Registro no M.S. nº 3.0119.6659.001-7

Responsável Técnico: Amarildo Ament - CRQ nº: 04215750 - IV Região - SP

“O nome do produto e o logo Syngenta são marcas de uma Companhia do Grupo Syngenta”.

‘Bitrex’ e logotipo Bitrex são marcas registradas da Macfarlan Smith Limited.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:	
Grupo Químico: Cumarínico	
Nome Comum: BRODIFACOUM	
Antídoto e Tratamento: Vitamina K ₁ e tratamento sintomático	
Telefone de emergência 24 horas: 0800 704 4304	

Nº do Lote:	Impresso na embalagem
Data de Fabricação:	Impresso na embalagem
Prazo de Validade:	2 anos após a data de fabricação

WARNING

AVISO

Children can fall into bucket and drown.

Keep children away from bucket with even a small amount of liquid.

Niños pueden caer adentro del balde y ahogarse.

Mantenga los niños alejados de los baldes, aunque solamente tengan un poco de liquido.