



## NEPOREX® 50 SP

### **Fórmula:**

Cada 100 g contém:

Ciromazine técnico (Min. 92%) ..... 54,3 g

Inertes q.s.p. .... 100,0 g

### **Indicações:**

NEPOREX 50 SP é indicado para o controle de moscas em geral no esterco de aves e suínos, através da pulverização direta sobre estes materiais.

### **Dosagem:**

#### 1. Aves criadas em gaiolas

Recomenda-se pulverizar o esterco acumulado sob as gaiolas, na dosagem de 1 g de NEPOREX 50 SP para cada metro quadrado. Esta concentração é obtida diluindo-se 100 g de NEPOREX 50 SP em 20 litros de água e aplicando-se 1 litro da solução para cada 5 m<sup>2</sup> de esterco.

Os pulverizadores costais são os mais práticos para este tratamento. Antes do tratamento com NEPOREX 50 SP, aconselhasse a retirada de 90% do esterco velho e infestado com pupas. A pequena parte restante visa propiciar um meio de preservação dos “predadores” naturais presentes no esterco. A fim de evitar-se a formação de pupas, formas estas não atingidas pelo NEPOREX 50 SP, a aplicação deve ser feita no máximo até 5 dias após a retirada do esterco ou quando o mesmo atingir 5 cm de altura. A aplicação de 1 g de NEPOREX 50 SP por metro quadrado de esterco com altura de 5 cm, confere uma concentração de aproximadamente 10 ppm do princípio ativo no esterco.

Para se obter a diminuição rápida da população de moscas no ambiente, sugere-se que no dia da aplicação do NEPOREX 50 SP, seja feito um tratamento ambiental na forma de colocação de iscas mosquicidas (Vetor® ou Alfacron®)

O esterco tratado com NEPOREX 50 SP fica protegido contra infestação de larvas de moscas por um período de até 4 semanas. A população de moscas no ambiente, contudo, é mantida sob controle por até 6 semanas, período este que pode ser aumentado com a aplicação de iscas inseticidas entre a 6<sup>a</sup> e a 7<sup>a</sup> semana. Após este período recomenda-se tratar novamente com NEPOREX 50 SP.

Não havendo possibilidade de retirada do esterco, recomenda-se a reaplicação do produto em todos os principais focos de larvas, até que se possa remover todo o esterco e repetir-se o tratamento completo.

## 2. Suínos

Recomenda-se a aplicação semanal de NEPOREX 50 SP nas esterqueiras ou montes de esterco, na proporção de 1 g do produto para cada metro quadrado de superfície.

Caso a esterqueira seja do tipo que armazena esterco líquido, a aplicação pode ser feita a cada 4 semanas.

Dosagem:

Aves criadas em gaiolas e suínos:

1 grama de NEPOREX 50 SP para cada metro quadrado. Esta concentração é obtida diluindo-se 100 g do produto em 20 litros de água e aplicando-se 1 litro da solução para cada 5 m<sup>2</sup> de esterco.

Forma de aplicação

Aplicar com regador ou pulverizador costal.

### **Administração:**

Vide dosagem

### **Precauções:**

- Manter as embalagens em local fresco e seco.
- Recomenda-se o uso de luvas de borracha quando da aplicação do produto.
- Evitar o contato do produto com os olhos, pele e roupas.
- Em caso de acidente, lavar as partes atingidas com água em abundância.
- Conservar longe do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos.
- Manipular o produto somente em áreas arejadas.
- Não fumar ou beber durante a aplicação do produto.
- Após a manipulação do produto, lavar bem as mãos.

Antídoto:

Não específico, tratamento sintomático.

### **Apresentação:**

Sache contendo 100g

### **Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:**

2250 em 25/06/85

### **Responsável Técnico:**

Victor Walzberg - CRMV: SP 6392