

Nome Produto	Goliath
Registrado no Ministério da Saúde sob No	3.0404.0030.001-5
Registrante	BASF
Indicações de uso	<p>Goliath é uma isca inseticida gel pronta para uso profissional no controle de baratas. Goliath é eficaz contra barata alemã (<i>Blattella germanica</i>) e barata americana (<i>Periplaneta americana</i>).</p> <p>Goliath pode ser utilizado contra as baratas em</p> <ul style="list-style-type: none"> - Habitações (incluindo cozinhas), - Edifícios públicos tais como hospitais, prisões, teatros, hotéis etc, - Instalações industriais e comerciais tais como usinas, magazines, restaurantes etc, - Cozinhas industriais, oficinas, aeronaves, veículos, trens e embarcações
Composição	<p>Ingrediente ativo: FIPRONIL - 0,05% p/p</p> <p>Ingredientes Inertes: Benzoato de denatonium - 0,005 p/p</p> <p>Solvente e Atrativo - 99,945 p/p</p>
Grupo Químico	Fenil pirazol
Modo de Aplicação	<p>Goliath é mais efetivo quando posicionado dentro ou próximo aos abrigos e áreas de alimentação das baratas. Estas áreas são tipicamente escuras, quentes, úmidas e permanecem intocadas, como por exemplo atrás de refrigeradores e equipamentos elétricos. Localizar tais áreas através de técnicas apropriadas, tais como inspeção ou uso de armadilhas. Para melhores resultados, a superfície a ser tratada deve ser limpa e asseada antes do tratamento prestando atenção particular para a remoção de fontes de alimentos alternativos.</p> <p>Os cartuchos de Goliath são designados para serem usados com uma pistola aplicadora. Prenda o cartucho de Goliath à pistola aplicadora e anexe a ponteira de aplicação apropriada. Consultar as instruções do fabricante para informações sobre o uso da pistola aplicadora.</p> <p>Goliath deve ser aplicado por toda área infestada em pequenas gotas. Gotas do gel devem ser aplicadas em locais escuros, fora de visão, em fendas, rachaduras, atrás de armários e prateleiras, painéis de energia elétrica, dutos, sob peças sanitárias etc. Não aplicar Goliath em locais que são lavados ou onde pode ser facilmente removido por limpeza rotineira. Não aplicar inseticidas sobre ou próximo à Goliath e não posicionar o produto em superfícies recentemente tratadas, pois isto pode desencorajar as baratas a se alimentarem do gel. Se Goliath contaminar a superfície não-alvo, remover o gel com uma toalha de papel e a jogue no lixo. Limpe a área completamente. Em áreas infestadas, baratas mortas serão encontradas normalmente 24 horas após o tratamento.</p> <p>Em caso de infestação severa e em áreas que são particularmente sujas, não asseadas ou onde fontes alternativas de alimento não possam ser totalmente eliminadas, usar uma alta dosagem de aplicação.</p> <p>- Barata alemã (<i>Blattella germanica</i>): Dose Alta: Duas gotas de 0,03 g de gel/m². Dose Normal: Uma gota de 0,03 g de gel/m².</p> <p>- Barata americana (<i>Periplaneta americana</i>): Dose Alta: Três gotas de 0,03 g de gel/m². Dose Normal: Duas gotas de 0,03 g de gel/m².</p> <p>Uma suave pressão no gatilho da pistola aplicadora soltará uma gota de 0,03g a qual deverá ser entre 3 a 4 mm de diâmetro.</p>
Mecanismo de Ação	<p>Uma vez ingerido pelas baratas, estas irão contaminar as outras através da troca de alimentos, através da canibalização de carcaças mortas pelo contato primário, bem como ingerindo as fezes das baratas contaminadas, gerando o efeito em cadeia por contaminação secundária.</p>
Intervalo de Reentrada nas Áreas tratadas	<p>Áreas tratadas devem ser re-inspecionadas depois de 1 a 2 semanas. Onde a infestação inicial era severa, pode ser necessária uma segunda aplicação de Goliath Gel, caso o primeiro tratamento tenha sido totalmente consumido e ainda haja a presença de baratas vivas.</p>

Telefones de Emergência:
0800-112273 ou (0XX12)3128-1357.